

MENTE: - Raivoso, rancoroso, vingativo, violento, - Crueldade - Pessoa mal-humorada.

PRINCIPAIS SINTOMAS:

- Metástases (queixas alternantes).
- Marasmo.
- Caxumba desaparece da face, e então vai para os testículos. (Puls: Caxumba vai da face para os testículos e pode permanecer na face). - Genitália, inchaço dos testículos, caxumba, de: Abrot (1), Puls(3).
- Diarréia para, então dor no coração; a dor se vai, daí vem a diarréia. - Hemorróidas, sangram tão logo o reumatismo melhora.

SUPRESSÃO: - De uma condição mudando para outra condição. CRIANÇAS. - Bebês, crianças que não ganham peso, com erupções, especialmente em volta do umbigo, com aspecto envelhecido (face enrugada), (emagrecimento). - Bebês com secreções, sangue, erupções no umbigo. - Marasmo: especialmente definhamento de extremidades inferiores em bebês, - Emagrecimento com apetite voraz. GENERALIDADES: - Diarréia. - Noite. - Fraqueza após gripe. - Dor reumática em todas as articulações. Aconitum napellus MENTE: - Convencidos de que vão morrer, predizem a hora. - Medo de morte no trabalho de parto. - Extrovertidos, compassivos. Ansiedade pelos outros. - Desejam companhia. Inquietude medrosa. - Medo de que o coração possa parar. - Clarividência. Predizendo a morte. - Estados de pânico. Súbito, violento, como um terremoto interno. MEDO: - Multidões, lugares estreitos, espaços abertos. - Escuro, elevador, túnel, doença cardíaca, - Desmaios, aviões, terremotos. GENERALIDADES - Tradicional para casos agudos. - Crises violentas, principalmente emocionais. - Extrema excitabilidade dos sistemas nervoso e vascular. - Calor (20% frio). Desejam o ar livre, - Ao esfriar rápido: tempo frio e seco, - Vento frio seco, vento leste, ao esfriarem quando estão sobreaquecidos. - Pletóricos. Com movimento; crepúsculo; toque (especialmente durante a febre). - Descargas (vômitos, diarréia). Icterícia nos recém-nascidos. - Após forte susto, choque. Experiência de morte iminente. - Palpitações, face vermelha. Vertigem, entorpecimento de um só lado, - Fraqueza, teme desmaiar. - Transpiração, trêmulo, dispnéia. - 0-4 a.m. 15-30 minutos após adormecer. - Ao adormecer (Lach). Crepúsculo (até a meia-noite). - Calma nos intervalos entre os estados de pânico. VERTIGEM - Durante pânico. - Ao se levantar. CABEÇA - Dores em pontada (Bell: Latejante). FACE - Neuralgia após vento seco, frio (nas primeiras horas. Após 4 dias: Caust, Nux-v). - Uma face vermelha, a outra pálida (Cham). - Entorpecimento de um só lado. LARINGE - Crupe no estágio inicial (primeiro remédio). ESTÔMAGO - Sede de grandes quantidades (água fria); - Tudo tem gosto amargo, com exceção da água. URINA - Retenção de urina em recém-nascidos (também na mãe). - Urina freqüentemente durante a crise. OVÁRIOS: - Inflamação aguda dos ovários por menstruação suprimida. RESPIRAÇÃO - Hiperventila com um som cupral, agonizante com

medo de Sufocação. PEITO - Palpitações, com ansiedade medo da morte. - Dor em pontada ao redor do coração. - Medo que o coração exploda. FEBRE - Febre alta, ex.: pneumonia, orelhas vermelhas, medo da morte. - Algumas vezes febre súbita, alta, fraqueza e sonolência, sem outros sintomas.